

Duraxet®
Dapoxetine
F.C Tablets 30&60 mg

دوراکست®
داپوکستین
قرص روکش دار ۳۰ و ۶۰ میلی گرمی

اطلاعات این راهنما را قبل از مصرف دارو و با هر بار مصرف بسته جدید به صورت دقیق مطالعه کنید؛ زیرا ممکن است اطلاعات جدیدی به آن اضافه شده باشد. این اطلاعات جایگزین مشورت با پزشک درباره وضعیت بیماری و یا داروهای مصرفی شما نیست. دوراکست® (داپوکستین) از دسته داروهای مهار کننده بازجذب سروتونین (SSRI) می باشد. این دارو همچنین در درمان اختلالات جنسی کاربرد دارد.

موارد مصرف:

زود انزالی از مهمترین علل بروز اضطراب در روابط جنسی آقایان می باشد. داپوکستین با به تاخیر انداختن زمان انزال، امکان کنترل بیشتری برای آقایان فراهم می نماید. دوراکست® جهت درمان زود انزالی آقایان ۱۸ تا ۶۴ ساله استفاده می شود.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف دارو موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

- حساسیت به داپوکستین و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این فرآورده؛
- در صورت سابقه هر گونه بیماری قلبی مانند نارسایی قلبی یا اختلال در ضربان قلب؛
- در صورت وجود سابقه مانیا (جنون) همراه با علائمی از قبیل احساس هیجان زیاد، تحریک پذیری و عدم تمرکز؛
- در صورت ابتلا به افسردگی شدید؛
- در صورت ابتلا و یا سابقه ابتلا به نارسایی متوسط یا شدید کبدی.

مقدار و نحوه مصرف:

• دوز معمول دارو ۳۰ میلی گرم در روز می باشد و ممکن است توسط پزشک تا ۶۰ میلی گرم در روز نیز افزایش یابد.

• زمان توصیه شده برای مصرف قرص، یک تا سه ساعت قبل از رابطه جنسی می باشد.

• از مصرف دوراکست® بیش از روزی یک عدد (فاصله زمانی بیشتر از ۲۴ ساعت) خودداری کنید.

• این دارو می تواند همراه با غذا و یا بدون غذا مصرف شود.

• مصرف این دارو می بایست همراه با حداقل یک لیوان آب صورت گیرد.

• از مصرف آب گریپ فروت از ۲۴ ساعت قبل از مصرف دوراکست® خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

• استفاده از این دارو در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۴ سال توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

• عوارض بسیار شایع (بیشتر از یک نفر در ۱۰ نفر):

- احساس گیجی
- سر درد
- احساس ناخوشی و کسالت

• عوارض شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰ نفر):

- احساس تحریک پذیری، آشفتگی، پرخاشگری و بی قراری
- بی حسی یا سوزن سوزن شدن
- مشکل در نعوظ و یا حفظ آن
- تعریق بیش از حد و گرگرفتگی
- اسهال، یبوست یا دفع گاز
- درد شکمی و نفخ
- مشکلات خواب
- احساس خستگی و خواب آلودگی، خمیازه کشیدن
- احتقان بینی
- افزایش فشار خون
- کاهش در تمرکز
- لرزش
- کاهش میل جنسی
- صدای زنگ در گوش
- تاری دید
- سوء هاضمه
- خشکی دهان

- عوارض غیر شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰۰ نفر):
- غش کردن یا احساس سرگیجه هنگام ایستادن
- تغییر در خلق و خو
- احساس گیجی، سردرگمی یا عدم تمرکز
- ضربان قلب آهسته یا نامنظم و یا افزایش ضربان قلب
- از دست دادن میل جنسی
- احساس ضعف، بی‌حالی یا خستگی
- احساس افسردگی یا بی‌تفاوتی
- احساس گرما و بی‌قراری
- مشکلات بینایی (درد چشم یا گشاد شدن مردمک‌ها)
- فشار خون پایین یا بالا
- احساس خارش یا عرق سرد
- احساس چرخش
- طعم غیرطبیعی در دهان
- دندان قروچه

- عوارض نادر (کمتر از یک نفر در ۱۰۰۰ نفر):
- احساس سرگیجه به دنبال فعالیت
- به خواب رفتن ناگهانی
- احساس نیاز فوری به دفع

هشدارها و موارد احتیاط:

- در صورت عدم تشخیص قطعی زود انزالی توسط پزشک و یا ابتلا به سایر مشکلات جنسی از مصرف دارو خودداری کنید.
- در صورت سابقه گیجی ناشی از پایین بودن فشار خون، پیش از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت سابقه مصرف مواد نشاط آور مانند LSD، داروهای مخدر (نارکوتیک)، بنزودیازپین‌ها و مصرف الکل، پیش از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت وجود سابقه بیماری‌های اعصاب و روان (جنون، اختلال دوقطبی، افسردگی، اسکیزوفرنی)، مشکلات انعقاد خون و یا سابقه خونریزی، مشکلات کلیوی و احتمال بالا بودن فشار چشم (گلوکوم یا آب سیاه)، با پزشک خود مشورت کنید.

تداخلات دارویی:

- در صورت مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) مانند ایبوپروفن یا آسپیرین، داروهای ضد انعقاد خون مانند وارفارین، داروهای برطرف کننده اختلالات نعوظ، داروهای کاهنده فشار خون و داروی ضد تهوع اپریتانت، با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت مصرف داروهای مهارکننده مونوآمینواکسیداز (MAO)، تیوریدازین، لیتیم و سایر داروهای ضد افسردگی، لینزولید، تریپتوفان، ترامادول، گیاه علف چای و داروهای ضد میگرن، از مصرف دوراکست[®] خودداری نمایید. در صورت نیاز به مصرف داروهای ذکر شده با تجویز پزشک، مصرف دوراکست[®] را ۱۴ روز پس از قطع داروهای فوق آغاز نمایید. شروع مجدد مصرف داروهای ذکر شده می‌بایست ۷ روز پس از قطع دوراکست[®] باشد.
- در صورت الزام مصرف داروهای ضد قارچ مانند کتوکونازول و یا ایتراکونازول، داروهای درمان HIV مانند ریتوناویر، ساکوییناویر، نلفیناویر یا آتازاناویر، آنتی بیوتیک‌هایی مانند اریترومايسين یا کلاریترومايسين جهت درمان عفونت‌ها و داروهای ضد افسردگی مانند نفازودون، با پزشک خود مشورت نمایید.

نحوه نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت، گرما و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه خودداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

این دارو باید حتماً با تجویز پزشک مصرف شود. از در اختیار قرار دادن دارو برای آشنایان حتی در صورتی که علائم مشابه شما را دارند خودداری کنید؛ زیرا ممکن است برای ایشان آسیب‌زا باشد.

شرکت دارویی اکتورکو، کرج، ایران

