

Actevidol®
Carvedilol
Scored tablets 6.25 & 12.5 mg

اکتویدل®
کارودیلول
قرص های خط دار ۶.۲۵ و ۱۲.۵ میلی گرم

اطلاعات این راهنما را قبل از مصرف دارو و با هر بار مصرف بسته جدید به صورت دقیق مطالعه کنید؛ زیرا ممکن است اطلاعات جدیدی به آن اضافه شده باشد. این اطلاعات جایگزین مشورت با پزشک درباره وضعیت بیماری و یا داروهای مصرفی شما نیست.

اکتویدل® متعلق به گروهی از داروها به نام بتا بلاکرها است که با کاهش مقاومت عروقی باعث کاهش فشار خون می شود.

موارد مصرف:

- برای درمان بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی متوسط تا شدید؛
- برای درمان بیماری که دچار حمله قلبی شده اند و میزان پمپاژ قلب نامناسبی دارند؛
- برای درمان بیماران مبتلا به فشار خون بالا.

راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو در رابطه با موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
- در صورت حساسیت به کارودیلول یا هر یک از مواد تشکیل دهنده این دارو؛
- در صورت ابتلا به آسم یا سایر مشکلات ریوی (مانند برونشیت یا آمفیژم)؛
- در صورت مشکلات گردش خون در پاها؛
- در صورت ابتلا به دیابت؛
- در صورت ابتلا به مشکلات تیروئید؛
- در صورت سابقه ابتلا به فتوکروموسیتوما (بیماری ناشی از ترشح بیش از حد هورمون هایی مانند آدرنالین و نورآدرنالین ایجاد می شود و شایعترین علامت آن فشارخون بالا می باشد)؛
- در صورتی که قرار است جراحی انجام دهید؛
- در صورت سابقه واکنش های آلرژیک شدید؛
- در صورتی که باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید؛
- در صورتی که در حال شیردهی هستید یا قصد شیردهی دارید؛
- در صورتی که قصد انجام جراحی آب مروارید دارید؛
- در صورت مصرف هر گونه داروی نسخه ای، بدون نسخه، داروهای گیاهی، ویتامین و مکمل ها.

مقدار و نحوه مصرف:

- دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید.
- اکتویدل® را بهتر است همراه با غذا مصرف کنید.
- در صورت فراموشی یک نوبت از مصرف اکتویدل®، به محض یادآوری آن را مصرف کنید؛ مگر آن که زمان یادآوری به نوبت مصرف بعدی دارو نزدیک باشد. در این شرایط نوبت فراموش شده را مصرف نکرده و نوبت بعدی را در زمان خودش مصرف کنید و به هیچ وجه مقدار مصرف دارو را دو برابر نکنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- بارداری**
- کارودیلول ممکن است برای جنین آسیب رسان باشد. در صورت بارداری در هنگام مصرف دارو فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.
- شیردهی**
- به علت ترشح این دارو در شیر مادر، هنگام مصرف کارودیلول از شیردهی خودداری کنید.

موارد منع مصرف:

- در صورت سابقه حساسیت به کارودیلول و یا هر جزء دیگری از دارو؛
- در صورت ابتلا به نارسایی قلبی شدید، در شرایطی که بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری است یا نیاز به تزریق داخل وریدی دارد؛
- در صورت مصرف داروهایی که با افزایش قدرت انقباضی قلب به گردش خون کمک می کنند (داروهای اینوتروپیک)؛
- در صورتی که مستعد ابتلا به آسم یا سایر مشکلات تنفسی هستید؛
- در صورتی که ضربان قلب نامنظم دارید؛
- در صورتی که فشار خون بسیار پایین دارید؛
- در صورت ابتلا به مشکلات کبدی.

عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثر درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض جانبی ناخواسته شود. اگرچه همه عوارض جانبی در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هر یک از علائم یا عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

• عوارض جانبی جدی دارو
 در صورت مشاهده هر یک از عوارض جانبی زیر، بلافاصله به پزشک خود اطلاع داده یا به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید:
 - واکنش های حساسیتی شدید: علائمی شامل تورم ناگهانی گلو، صورت، لب ها و دهان که ممکن است تنفس یا بلع را دشوار کند.
 - درد قفسه سینه همراه با تنگی نفس، تعریق و احساس تهوع.
 - ایست قلبی: علائم شامل ضربان قلب بسیار کند یا توقف آن می باشد؛ همچنین ممکن است احساس سرگیجه، خستگی غیرعادی و تنگی نفس نیز مشاهده شود. این عارضه به ویژه در افراد بالای ۶۵ سال یا افرادی که ضربان قلب نامنظم دارند، شایع تر است.
 - کاهش دفع ادرار همراه با تورم پاها که می تواند نشانه مشکلات کلیوی باشد.
 - افت شدید قند خون (هیپوگلیسمی) که ممکن است باعث تشنج یا بیهوشی شود.
 - عوارض پوستی شدید.
 • سایر عوارض جانبی:
 عوارض بسیار شایع (بیشتر از یک نفر در ۱۰ نفر):
 - سرگیجه
 - سردرد
 - احساس ضعف و خستگی
 - مشکلات قلبی
 - افت فشار خون
 عوارض شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰ نفر):
 - عفونت های مجاری تنفسی
 - عفونت های دستگاه ادراری
 - کاهش تعداد گلبول های قرمز خون
 - افزایش سطح کلسترول خون
 - عدم کنترل قند خون در افراد دیابتی
 - افسردگی
 - مشکلات بینایی، خشکی چشم یا درد چشم به دلیل کاهش تولید اشک
 - ضربان قلب آهسته
 - احساس سرگیجه یا سبکی سر بعد از بلند شدن
 - احتباس مایعات با علائمی مانند: تورم کلی بدن، تورم برخی از قسمت های بدن مانند دست، پا، مچ پا و ساق پا
 - مشکلات گردش خون در بازوها و پاها با علائمی شامل سردی دست و پا، سفیدی، سوزن سوزن شدن و درد انگشتان و درد ساق پا که هنگام راه رفتن بدتر می شود
 - مشکلات تنفسی
 - احساس تهوع یا استفراغ
 - اسهال
 - درد معده یا سوء هاضمه
 - درد در دست ها و پاها
 - مشکلات کلیوی، از جمله تغییر در دفعات ادرار

هشدارها و موارد احتیاط:

• در صورت افت فشار خون با علائم سرگیجه یا احساس سبکی سر، به خصوص هنگام بلند شدن از حالت نشسته یا خوابیده فوراً بنشینید یا دراز بکشید.
 • در صورت احساس خستگی یا سرگیجه از رانندگی، کار با ماشین آلات یا انجام فعالیت هایی که نیازمند هوشیاری کامل هستند خودداری کنید.
 • در صورت کند شدن ضربان قلب خود به پزشک اطلاع داده و یا به نزدیک ترین اورژانس مراجعه نمایید.
 • در صورت ابتلا به دیابت و مصرف کارودیلول، هرگونه تغییر در قند خون خود را به پزشک اطلاع دهید.
 • کارودیلول ممکن است علائم قند خون پایین و همچنین علائم پرکاری تیروئید را پنهان کند، از این رو پایش های لازم طبق صلاحدید پزشک انجام می شود.

تداخلات دارویی:

• ایندومتاسین	• انسولین	• آمیودارون
• ایبوپروفن	• متفورمین	• سایمتیدین
• سالبوتامول	• کلونیدین	• دیگوکسین
• سولفات تربوتالین	• سیکلوسپورین	• ریفامپین
• آدرنالین	• تاکرولیموس	• فلوکستین
• اپی نفرین	• آسپیرین	• پاروکستین

نحوه نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور، رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
 - از مصرف این دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه خودداری کنید.
 - این دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

این دارو باید حتماً با تجویز پزشک مصرف شود. از در اختیار قرار دادن دارو برای آشنایان، حتی در صورتی که علائم مشابه شما را دارند خودداری کنید؛ زیرا ممکن است برای ایشان آسیب زا باشد.

شرکت دارویی اکتوور کو، کرج، ایران

References:

- 1- https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/020297Orig1s039correctedlbl.pdf
- 2- <https://www.medicines.org.uk/emc/files/pii.3106.pdf>

