

Actofen®

Acetaminophen 500
Effervescent tablet
Sugar free

اكتوفن®

استامينوفن ۵۰۰
قرص جوشان
بدون شکر

اطلاعات این راهنما را قبل از مصرف دارو و با هر بار مصرف بسته جدید به صورت دقیق مطالعه کنید؛ زیرا ممکن است اطلاعات جدیدی به آن اضافه شده باشد. این اطلاعات جایگزین مشورت با پزشک درباره وضعیت بیماری و یا داروهای مصرفی شما نیست. این دارو حاوی استامینوفن است که به دسته داروهای تسکین دهنده درد تعلق داشته و منجر به کاهش درد و تب می شود.

موارد مصرف:

استامینوفن در درمان بسیاری از دردهای خفیف تا متوسط از جمله سردرد، میگرن، دردهای اسکلتی-عضلانی، دردهای دوران قاعدگی و دندان درد و برای کاهش تب استفاده می شود.

راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف دارو موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:
- در صورتی که به دارو یا سایر اجزای تشکیل دهنده آن حساسیت دارید؛
- در صورت ابتلا و یا سابقه ابتلا به بیماری های کبدی یا کلیوی؛
- در صورتی که کمبود وزن دارید یا دچار سوء تغذیه هستید؛
- در صورت ابتلا به عفونت های شدید؛
- در صورت مصرف هر گونه داروی نسخه ای، بدون نسخه، داروهای گیاهی، ویتامین و مکمل ها.

مقدار و نحوه مصرف:

- اکتوفن® را مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید.
- مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:
- بزرگسالان و کودکان بالای ۱۶ سال با وزن بیشتر از ۵۰ کیلوگرم:
- در صورت نیاز هر ۴ تا ۶ ساعت یک تا دو قرص مصرف شود. هر قرص می بایست در یک لیوان آب حل شود. (از مصرف بیش از ۸ قرص (۴ گرم) در یک روز (۲۴ ساعت) خودداری کنید.)
- کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله:
- در صورت نیاز هر ۴ تا ۶ ساعت یک قرص در یک لیوان آب حل شود. (از مصرف بیش از ۴ قرص در یک روز (۲۴ ساعت) خودداری کنید.)
- برای دریافت دوز کامل از دارو لازم است تا تمام محلول آماده شده را مصرف کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- بارداری
- در صورتی که باردار هستید یا قصد بارداری دارید، با پزشک خود مشورت کنید. در صورت لزوم و بر اساس تجویز پزشک دارو می بایست با کمترین دوز ممکن و کوتاه ترین دوره درمان استفاده شود.
- شیردهی
- در صورتی که در دوران شیردهی هستید یا قصد شیردهی دارید، با پزشک خود مشورت کنید.

موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به استامینوفن یا هر یک از اجزای موجود در ترکیب این دارو؛
- مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی اثرات ناخواسته نیز گردد؛ اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- اضطراب و بی قراری؛

- تحریک پذیری؛
- مشکل در به خواب رفتن؛
- واکنش های حساسیتی که ممکن است شدید باشد؛ مانند بثورات پوستی و خارش، تورم دهان، صورت، دست و یا تنگی نفس؛
- زخم های دهان؛
- مشکلات تنفسی؛
- کبودی یا خونریزی بدون علت؛
- حالت تهوع؛
- کاهش وزن ناگهانی و کاهش اشتها؛
- زردی چشم و پوست.

هشدارها و موارد احتیاط:

- از مصرف همزمان این دارو همراه با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری کنید.
- استفاده از این دارو برای مدت طولانی توصیه نمی شود؛ مگر این که به تشخیص پزشک نیاز به مصرف طولانی مدت آن داشته باشید.
- در صورت مشاهده علائم اسیدوز متابولیک شامل تنفس عمیق، سریع و دشوار، تهوع، استفراغ و از دست دادن اشتها فوراً با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت ابتلا به آسم و یا حساسیت به آسپیرین پیش از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- در هنگام استفاده از این دارو از مصرف الکل پرهیز کنید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پیش از شروع درمان با پزشک خود مشورت نمایید:

- کلرامفنیکل؛
- متوکلوپرامید؛
- دومپریدون؛
- کلستیرامین؛
- وارفارین؛
- لاموتریژین؛
- فنوباریتال؛
- پروبنسید؛
- لیتیوم.

نحوه نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه خودداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- از در اختیار قرار دادن دارو برای آشنایان حتی در صورتی که علائم مشابه شما را دارند خودداری کنید؛ زیرا ممکن است برای ایشان آسیب زا باشد.

شرکت دارویی اکتوورکو، کرج، ایران

