

**FAMOVER®**  
Famotidine  
F.C. Tablets 20 and 40 mg

**فاموور®**  
فاموتیدین  
قرص روکشدار ۲۰ و ۴۰ میلی گرمی

#### راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.  
قبل از شروع درمان با این دارو، بروشور داخل بسته را به دقت مطالعه کنید. این بروشور به شما کمک می کند تا اطلاعات دارویی راجع به دارو را به دست آورده و از عوارض جانبی احتمالی آن مطلع شوید.

#### دسته دارویی:

آنتاگونیست گیرنده H<sub>2</sub>، مهارکننده اسید

#### ترکیبات:

• قرص روکشدار حاوی ۲۰ میلی گرم فاموتیدین

• قرص روکشدار حاوی ۴۰ میلی گرم فاموتیدین

#### موارد مصرف:

• زخم معده و دوازدهه  
• سوزش و التهاب ناشی از برگشت اسید از معده به مری (رفلاکس)  
• سندرم زولینگر-الیسون (ترشح بیش از حد اسید معده)

#### موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به فاموتیدین یا سایر داروهای آنتاگونیست گیرنده H<sub>2</sub> و هر یک از مواد جانبی تشکیل دهنده این دارو  
- در دوران شیردهی

#### هشدارها و موارد احتیاط:

• پیش از مصرف این دارو موارد زیر را به پزشک و یا داروساز خود اطلاع دهید:  
- هرگونه سابقه حساسیت به این دارو و یا مواد تشکیل دهنده آن، سایر داروها و مواد غذایی  
- در صورت ابتلا به تومورهای بدخیم شکمی  
- در صورت ابتلا به عفونت مانند هلیکوباکتر پیلوری  
- در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی  
• در صورت بروز احساس گیجی شدید، از حال رفتن و ضربان قلب غیر طبیعی

#### کودکان و نوجوانان:

مصرف قرص فاموتیدین در کودکان با وزن کمتر از ۴۰ کیلوگرم توصیه نمی شود.

#### بارداری و شیر دهی:

ایمنی مصرف این دارو در بارداری به اثبات نرسیده است. از این رو مصرف آن محدود به مواردی است که بر اساس نظر پزشک، منافع حاصل از درمان بیشتر از خطرات احتمالی برای جنین باشد. در صورت بارداری یا احتمال آن قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید.  
این دارو در شیر مادر ترشح شده و مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود. لذا در صورت مصرف دارو، با پزشک مشورت نمایید.

#### مقدار و نحوه مصرف:

• زخم معده و دوازدهه:  
- دوز پیشنهادی در بزرگسالان ۴۰ میلی گرم یک بار در روز به هنگام خواب می باشد. اغلب بیماران طی ۴ هفته درمان می شوند. در صورت عدم درمان کامل زخم، دوره درمانی می تواند برای ۴ هفته دیگر ادامه یابد.  
- درمان می تواند با رژیم ۲۰ میلی گرم دوبار در روز نیز موثر باشد.  
- جهت درمان حمایتی، ۲۰ میلی گرم یک بار در روز به هنگام خواب توصیه می شود.  
• رفلاکس معده و مری:  
- دوز پیشنهادی در بزرگسالان ۲۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت ۶ هفته می باشد.  
• ازوفازیت همراه با زخم و آسیب:  
- ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت ۱۲ هفته می باشد.  
• سندرم زولینگر الیسون:  
- دوز ابتدایی پیشنهادی ۲۰ میلی گرم هر ۶ ساعت می باشد.  
- در صورت نیاز و بر اساس نظر پزشک افزایش دوز تا ۱۶۰ میلی گرم هر ۶ ساعت امکان پذیر می باشد.  
• در بیماران دچار مشکلات کلیوی:  
- در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی، پزشک ممکن است دوز دارو را کاهش دهد.  
- مصرف فاموتیدین در بیماران دیالیزی، می بایست پس از اتمام فرایند دیالیز صورت گیرد.

#### تداخلات دارویی:

- به علت تاثیر فاموتیدین بر روی آنزیم های کبدی و با توجه به این که بسیاری از داروها در بدن توسط کبد متابولیزه می شود، بهتر است پیش از مصرف فاموتیدین لیستی از داروهای مصرفی خود شامل داروهای نسخه ای،

بدون نسخه و داروهای گیاهی را در اختیار پزشک یا داروساز قرار دهید.  
- فاموتیدین می تواند باعث افزایش غلظت تیزانیدین در خون شود؛ بنابراین مصرف همزمان این دو دارو توصیه نمی شود.  
- در صورت مصرف کتوکونازول، ایتراکونازول، پروبنسید، سایر آنتی اسیدها، سوکرافیت و آتازاناویر حتما پزشک خود را مطلع کنید.  
- در صورت مصرف کلسیم کربنات به پزشک خود اطلاع دهید.  
**مصرف بیش از حد:**  
در صورت مصرف مقادیر زیاد دارو، به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنید.

#### عوارض جانبی:

مانند تمامی داروها، این دارو نیز می تواند عوارض جانبی ایجاد نماید؛ اما این به معنی بروز عوارض در همه افراد نمی باشد.  
• بسیار شایع (بیشتر از یک نفر در ۱۰ نفر):  
- سردرد  
- سرگیجه  
- یبوست  
- اسهال  
• غیر شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰۰ نفر):  
- تهوع یا استفراغ  
- درد شکمی  
- نفخ  
- خشکی دهان  
- کاهش اشتها  
- اختلال در چشایی  
- خارش شدید  
- راش پوستی  
- خستگی  
• نادر (کمتر از یک نفر در ۱۰۰۰ نفر):  
- کلستاز (کاهش جریان صفرا)  
• بسیار نادر (کمتر از یک نفر در ۱۰۰۰۰ نفر):  
- ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، نوتروپنی، آگرانولوسیتوز، آشفگی، توهم، اضطراب، بی قراری، افسردگی، کاهش میل جنسی، احساس سوزن سوزن شدن و یا بی حسی در دست ها و پاها، گیجی و خواب آلودگی، مشکل در به خواب رفتن، ریزش مو، احساس سفتی در قفسه سینه، کرامپ عضلانی، درد مفصل، اختلالات کبدی.

#### نگهداری و پایداری:

فاموتیدین باید در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و گرما نگهداری شود.  
بعد از پایان تاریخ انقضا از این دارو استفاده نکنید. تاریخ انقضا تا آخرین روز ماه ذکر شده می باشد.  
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

#### بسته بندی:

هر جعبه حاوی ۱۰ بلیستر

ساخت: کارخانه داروسازی اکتورکو، کرج - ایران

