

IRBESAL® 150 & 300

Irbesartan

Scored F.C. tablet 150 & 300 mg

ایربسارتان® ۱۵۰ و ۳۰۰

ایربسارتان

قرص روکشدار خط دار ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم

اطلاعات این راهنما را قبل از مصرف دارو و با هر بار مصرف بسته جدید به صورت دقیق مطالعه کنید؛ زیرا ممکن است اطلاعات جدیدی به آن اضافه شده باشد. این اطلاعات جایگزین مشورت با پزشک درباره وضعیت بیماری و یا داروهای مصرفی شما نیست.

ایربسارتان از دسته داروهای مهارکننده گیرنده آنژیوتانسین ۲ می باشد. آنژیوتانسین ۲ یک تنگ کننده عروقی قوی است. ایربسارتان با اتصال انتخابی به گیرنده های بافتی آنژیوتانسین ۲، سبب مهار اثر تنگ کننده عروق و همچنین اثر تحریکی آنژیوتانسین ۲ بر ترشح هورمون آلدوسترون شده و از این طریق موجب کاهش فشار خون می شود.

موارد مصرف:

ایربسارتان در درمان فشار خون بالا و جهت کاهش عوارض قلبی عروقی مرتبط با این بیماری مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این دارو در درمان نقره پاتی دیابتی در بیماران دارای دیابت نوع ۲ که به فشار خون بالا افزایش سطح کراتینین خون و پروتئینوری (دفع پروتئین از طریق ادرار) مبتلا هستند کاربرد دارد.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف دارو موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

- در صورتی که باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید.
- در صورتی که مکمل های پتاسیم و یا نمک های حاوی پتاسیم مصرف می کنید.
- در صورتی که از سایر داروهای مهارکننده سیستم رنین-آنژیوتانسین شامل مهارکننده های گیرنده آنژیوتانسین (ARB) مانند لوزارتان، والسارتان، و یا مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE) مانند انالپریل یا کاپتوپریل استفاده می کنید.

مقدار و نحوه مصرف:

- دارو را می توانید همراه با وعده غذایی یا بدون آن مصرف کنید.
- ایربسارتان برای درمان فشار خون بالا با دوز ۱۵۰ میلی گرم یک بار در روز تجویز می شود. برای دستیابی به کنترل مناسب فشار خون، دوز درمانی می تواند در صورت نیاز تا حداکثر ۳۰۰ میلی گرم در روز افزایش یابد.
- ایربسارتان برای درمان نقره پاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ با دوز ۳۰۰ میلی گرم در روز تجویز می شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- در صورتی که در دوران بارداری هستید و یا قصد بارداری دارید، پیش از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید. مصرف این دارو در هنگام بارداری ممنوع است. در صورتی که در زمان مصرف این دارو باردار شدید، مصرف دارو را قطع و فوراً با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورتی که در دوران شیردهی هستید و یا قصد شیردهی دارید، پیش از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به ایربسارتان یا هر یک از اجزاء موجود در ترکیب این دارو؛
- در صورتی که مبتلا به دیابت یا اختلال شدید کلیوی هستید و از داروهای کاهنده فشار خون حاوی آلیسکیرن استفاده می کنید؛
- اگر در سه ماهه دوم یا سوم بارداری خود هستید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی اثرات ناخواسته نیز شود؛ اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- عوارض بسیار شایع (بیشتر از یک نفر در ۱۰ نفر):
 - هایپرکالمی (افزایش سطح پتاسیم خون)
- عوارض شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰ نفر):
 - افت فشار خون وضعیتی
 - تهوع و احساس بیماری
 - خستگی
 - گیجی هنگام تغییر وضعیت
 - درد مفصلی و عضلانی
 - افزایش سطح خونی آنزیم کراتینین کیناز

- عوارض غیر شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰۰ نفر):
- افزایش ضربان قلب
- درد قفسه سینه
- گرگرفتگی
- سرفه
- اسهال، سوء هاضمه، سوزش معده
- اختلال جنسی

هشدارها و موارد احتیاط:

- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف بیش از مقدار تجویز شده خودداری کنید.
- در صورت وجود هر یک از موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- در صورت سابقه استفراغ شدید و اسهال پیش از شروع و یا در هنگام درمان با دارو؛
- در صورت مصرف دارو های ادرار آور یا استفاده از رژیم های کم نمک؛
- در صورت ابتلا به اختلالات کلیوی مانند تنگی شریان کلیوی یا سابقه پیوند کلیه؛
- در صورت ابتلا به بیماری های قلبی مانند تنگی دریچه، بزرگ شدن ماهیچه قلب یا نارسایی قلبی؛
- در صورت ابتلا به اختلال هورمونی آلدوسترونسم.
- مصرف ایربساتان در سه ماهه اول بارداری توصیه نمی شود؛ همچنین مصرف این دارو در سه ماه دوم و سوم، ممنوع است زیرا می تواند باعث آسیب جدی به جنین و یا نوزاد شود.
- در صورت نیاز به انجام عمل جراحی و یا دریافت داروهای بی هوشی، به پزشک خود اطلاع دهید.
- مصرف دارو در بزرگسالان بالای ۶۵ سال باید با احتیاط صورت گیرد.
- مصرف ایربساتان می تواند سبب افت قند خون به ویژه در افراد مبتلا به دیابت شود. در بیماران دیابتی که تحت درمان با انسولین یا سایر داروهای ضد دیابت قرار دارند، پایش دقیق سطح قند خون باید مد نظر قرار گیرد. در این مورد حتماً با پزشک خود مشورت کنید.
- مصرف همزمان داروی لیتیوم با ایربساتان توصیه نمی شود.
- در صورت فراموشی مصرف یک دوز از دارو، به محض به یاد آوردن فوراً آن را مصرف کنید. در صورتی که تقریباً زمان استفاده دوز بعدی فرا رسیده باشد، از دو برابر کردن دوز خودداری کرده و مصرف دوز بعدی را طبق روال تجویز دارو ادامه دهید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.
- ایربساتان جهت استفاده در کودکان توصیه نمی شود.

تداخلات دارویی:

- در صورت مصرف داروهای زیر، پیش از شروع استفاده از این دارو با پزشک خود مشورت کنید:
- داروهای مدر؛
- سایر داروهای کاهش دهنده فشار خون مانند مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE) شامل انالپریل، کاپتوپریل یا مهارکننده های گیرنده آنژیوتانسین (ARB) مانند لوزارتان و والسارتان؛
- مکمل های پتاسیم و یا نمک های حاوی پتاسیم؛
- لیتیوم؛
- داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) یا مهار کننده انتخابی سیکلوکسیژناز ۲ (COX-2) مانند سلکوکسیب یا استیل سالیسیلیک اسید؛
- آلیسکیرن؛
- هپارین؛
- ریپاکلینید.

نحوه نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
 - از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه خودداری کنید.
 - دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- این دارو باید حتماً با تجویز پزشک مصرف شود. از در اختیار قراردادن دارو برای آشنایان حتی در صورتی که علائم مشابه شما را دارند خودداری کنید؛ زیرا ممکن است برای ایشان آسیب زا باشد.

شرکت دارویی اکتوورکو، کرج، ایران

Reference:
<https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.11834.pdf>

