

Manazil®

Memantine/Donpezil

Each E.R. capsule 7/10 contains:

Memantine HCl Extended Release 7mg & Donepezil HCl 10mg

Each E.R. capsule 14/10 contains:

Memantine HCl Extended Release 14mg & Donepezil HCl 10mg

Each E.R. capsule 21/10 contains:

Memantine HCl Extended Release 21mg & Donepezil HCl 10mg

Each E.R. capsule 28/10 contains:

Memantine HCl Extended Release 28mg & Donepezil HCl 10mg

مانازیل®

ممانتین / دنپزیل

هر کپسول پیوسته رهش ۷/۱۰ حاوی:

ممانتین هیدروکلراید پیوسته رهش ۷ میلی گرم و دنپزیل هیدروکلراید ۱۰ میلی گرم

هر کپسول پیوسته رهش ۱۴/۱۰ حاوی:

ممانتین هیدروکلراید پیوسته رهش ۱۴ میلی گرم و دنپزیل هیدروکلراید ۱۰ میلی گرم

هر کپسول پیوسته رهش ۲۱/۱۰ حاوی:

ممانتین هیدروکلراید پیوسته رهش ۲۱ میلی گرم و دنپزیل هیدروکلراید ۱۰ میلی گرم

هر کپسول پیوسته رهش ۲۸/۱۰ حاوی:

ممانتین هیدروکلراید پیوسته رهش ۲۸ میلی گرم و دنپزیل هیدروکلراید ۱۰ میلی گرم

اطلاعات این راهنما را قبل از مصرف دارو و با هر بار مصرف بسته جدید به صورت دقیق مطالعه کنید؛ زیرا ممکن است اطلاعات جدیدی به آن اضافه شده باشد. این اطلاعات جایگزین مشورت با پزشک درباره وضعیت بیماری و یا داروهای مصرفی شما نیست.

موارد مصرف:

مانازیل® برای درمان دمانس با شدت متوسط تا شدید در بیماران مبتلا به آلزایمر استفاده می شود. مانازیل® حاوی دو داروی ممانتین و دنپزیل می باشد. ممانتین آنتاگونیست گیرنده ان-متیل-دی-آسپارتات (NMDA) و دنپزیل، مهارکننده استیل کولین استراز است. مانازیل® در بیمارانی که روزانه ۱۰ میلی گرم دنپزیل هیدروکلراید مصرف می کنند، قابل تجویز می باشد.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف دارو موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

• سابقه و یا ابتلا به هر گونه بیماری؛

• سابقه هر نوع حساسیت به این دارو یا مواد تشکیل دهنده آن؛

• ابتلا به مشکلات قلبی از جمله ضربان نامنظم، آرام یا تند قلب؛

• ابتلا به آسم یا مشکلات ریوی؛

• ابتلا به صرع و تشنج؛

• ابتلا به زخم معده؛

• ابتلا به مشکلات کلیه یا مثانه؛

• ابتلا به مشکلات کبدی؛

• در صورتی که قصد انجام هر گونه جراحی، اقدامات دندانپزشکی و دیگر اقدامات پزشکی نیازمند به بیهوشی دارید؛

• در صورتی که در دوران بارداری هستید یا قصد بارداری دارید؛

• در صورتی که در دوران شیردهی هستید یا قصد شیردهی دارید؛

• در صورت مصرف سایر داروها، ویتامین ها، مکمل ها و داروهای گیاهی.

مقدار و نحوه مصرف:

• مانازیل® را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید.

• تغییر مقدار مصرف یا قطع مانازیل® را بدون مشورت با پزشک انجام ندهید.

• مانازیل® را یک بار در شبانه روز، عصر ها و قبل از خواب میل کنید.

• مانازیل® را می توانید همراه با غذا یا بدون غذا مصرف کنید.

• می توانید کپسول مانازیل® را باز کرده و محتویات آن را پیش از مصرف روی پوره سیب بریزید و بلافاصله میل کنید. در این صورت از خالی کردن تمام محتویات کپسول اطمینان حاصل کنید. از تقسیم کردن، جویدن و خرد کردن محتویات کپسول خودداری کنید.

• از خرد کردن و جویدن کپسول های مانازیل® خودداری نموده و آن را به طور کامل بلعید.

• در صورت فراموش کردن مصرف به موقع دارو، نوبت فراموش شده را مصرف نکرده و نوبت بعدی را در زمان خودش مصرف کنید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

• از مصرف کپسول های آسیب دیده یا له شده خودداری کنید.

• در صورت مصرف بیش از حد دارو به مراکز درمانی یا اورژانس مراجعه کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بارداری:

در صورت بارداری یا قصد بارداری، پیش از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید. به علت مشخص نبودن اثرات مضر مستقیم یا غیرمستقیم دارو بر جنین، مصرف این دارو در دوران بارداری تنها در صورت صلاحدید پزشک امکان پذیر می باشد.

شیردهی:

اطلاعات کافی در رابطه با ترشح این دارو در شیر مادر و اثر آن بر نوزاد و تولید شیر وجود ندارد. در صورت مصرف این دارو با پزشک خود در رابطه با بهترین راه تغذیه شیرخوار مشورت کنید.

موارد منع مصرف:

از مصرف مانازیل® در موارد زیر خودداری کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به ممانتین، دنپزیل و یا هر یک از مواد تشکیل دهنده این دارو؛

- در صورت حساسیت به داروهای حاوی پیریدین.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی از اثرات ناخواسته نیز شود؛ اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

• عوارض جدی

- مشکلات عضلانی در صورت نیاز به بیهوشی؛

- کندی ضربان قلب و از حال رفتن: احتمال بروز این عارضه در افراد دارای مشکلات قلبی بیشتر است. در صورت بروز این عارضه فوراً با پزشک خود تماس بگیرید؛

- افزایش اسید معده: این عارضه احتمال زخم معده و خونریزی را افزایش می دهد (مخصوصاً در افراد با سابقه زخم معده و مصرف کنندگان آسپیرین و یا سایر داروهای

ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)؛:

- تهوع و استفراغ؛

- مشکل در دفع ادرار؛

- تشنج؛

- تشدید مشکلات ریوی در بیماران دچار آسم یا سایر بیماری های ریه.

• عوارض بسیار شایع

- سردرد؛

- اسهال؛

- احساس سرگیجه؛

- بی اشتهایی؛

- کبودی بدون علت.

هشدارها و موارد احتیاط:

- در صورت بروز هر یک از علائم زیر به مراکز درمانی مراجعه کنید یا با پزشک خود مشورت کنید:

• علائم واکنش های حساسیتی مانند کبیر، خارش، قرمزی، تورم، تاول یا پوسته ریزی یا با بدون تب، احساس تنگی نفس، خفگی، مشکل در تنفس، بلع یا صحبت کردن، تورم

صورت، دهان، لب ها، زبان یا گلو

• اختلال در دفع ادرار

• احساس سرگیجه شدید یا از حال رفتن (بیهوش شدن)

• تب، لرز یا گلو درد

• شروع مشکلات تنفسی یا تشدید آن

• تشنج

• دل درد یا سوزش سر دل

• مدفوع سیاه، قیری یا خونی

• استفراغ خونی یا تیره

• کندی ضربان قلب

• ضربان قلب غیرطبیعی

• کبودی

- تا زمانی که اثر دارو بر بدن شما مشخص نشده است، از رانندگی و انجام اقداماتی که نیاز به هوشیاری دارد خودداری کنید.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف مانازیل[®] لیست تمام داروهای خود را به پزشک خود اطلاع دهید.

در صورت مصرف داروهای زیر پیش از شروع درمان با مانازیل[®]، با پزشک خود مشورت نمایید:

- سدیم بی کرینات

- سایر آنتاگونیست های NMDA (آمانتادین، کتامین و دکسترومتورفان)

- کتو کونازول

- فنی توئین

- فنوباریتال

- کاربامازپین

- دکزامتازون

- ریفامپین

- بپیریدین، تری هگز یفنیدیل، هیوسین، دیسیکلومین، کلیدینیوم سی

- سوکسینیل کولین

شرایط نگهداری:

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.

• از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه خودداری کنید.

• دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

این دارو باید حتماً با تجویز پزشک مصرف شود. از در اختیار قراردادن دارو برای آشنایان، حتی در صورتی که علائم مشابه شما را دارند خودداری کنید؛ زیرا ممکن است

برای ایشان آسیب زا باشد.

شرکت دارویی اکتوورکو، کرج، ایران

References:

1-www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/206439s003lbl.pdf

2-UpToDate 2023/Donepezil and memantine

