

MUSERO®
Acetylcysteine 600
Powder for oral solution
Sugar free

موسرو®
استیل سیستئین ۶۰۰
پودر برای تهیه محلول خوراکی
بدون شکر

هر ساشه حاوی ۶۰۰ میلی گرم پودر برای تهیه محلول خوراکی استیل سیستئین
اطلاعات این راهنما را قبل از مصرف دارو و با هر بار مصرف بسته جدید به صورت دقیق مطالعه کنید؛ زیرا ممکن است
اطلاعات جدیدی به آن اضافه شده باشد. این اطلاعات جایگزین مشورت با پزشک درباره وضعیت بیماری و یا داروهای
مصرفی شما نیست.
استیل سیستئین از دسته دارویی موکولیتیک است. این دارو غلظت مخاط راه های هوایی را کاهش می دهد و دفع مخاط
را از طریق سرفه تسهیل می کند.

موارد مصرف:

• پودر استیل سیستئین جهت درمان سختی تنفسی و تنگی نفسی که به علت ازدیاد ترشحات غلیظ در راه های
هوایی ایجاد شده، تجویز می شود. واکنش استیل سیستئین با مواد شیمیایی موجود در مخاط باعث کاهش
چسبندگی و دفع راحت تر آن از طریق سرفه می شود. این امر به پاکسازی راه هوایی کمک کرده و باعث
راحت تر شدن تنفس می شود.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف دارو موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:
• سابقه و یا ابتلا به هر گونه بیماری؛
• سابقه هر نوع حساسیت به این دارو یا مواد تشکیل دهنده آن؛
• در صورت ابتلا به آسم؛
• در صورتی که در دوران بارداری یا شیردهی قرار دارید؛
• در صورت مصرف هر گونه داروی نسخه ای، بدون نسخه، داروهای گیاهی، ویتامین و مکمل ها.

مقدار و نحوه مصرف:

• پودر استیل سیستئین را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید.
• برای استفاده از پودر استیل سیستئین، محتویات ساشه را در یک لیوان آب مخلوط کرده و کامل به هم بزنید
تا حل شود.
• محلول آماده شده را بلافاصله مصرف کنید.
• برای دریافت دوز کامل از دارو لازم است تا تمام محلول آماده شده را مصرف کنید.
• محلول تهیه شده را با سایر داروها و مایعات دیگر به جز آب مخلوط نکنید.

موارد منع مصرف:

• مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی شود.
• در صورت حساسیت به استیل سیستئین و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو از مصرف آن خودداری
کنید.

هشدارها و موارد احتیاط:

• در صورت ابتلا به آسم با پزشک خود مشورت کنید؛ زیرا ممکن است در طول درمان با این دارو نیاز به پایش
و مراقبت داشته باشید.
• در صورت بدتر شدن سرفه یا تنفس پس از مصرف دارو، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.
• به علت کاهش اثر برخی از آنتی بیوتیک ها در مصرف همزمان با استیل سیستئین، توصیه می شود آنتی بیوتیک
های خوراکی را حداقل دو ساعت پیش یا پس از استیل سیستئین مصرف کنید.
• مصرف استیل سیستئین ممکن است در برخی از نتایج آزمایش های خون و ادرار اختلال ایجاد کند.
• در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده و بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ یا اسهال، فوراً به پزشک
خود اطلاع دهید.

بارداری و شیردهی:

به علت مشخص نبودن اثرات مضر مستقیم یا غیرمستقیم دارو بر جنین و همچنین ترشح دارو در شیر مادر، مصرف استیل سیستئین در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی اثرات ناخواسته نیز شود؛ اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر مصرف دارو را متوقف کرده و با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عوارض غیر شایع (کمتر از یک نفر در ۱۰۰ نفر):

- سردرد
- صدای زنگ در گوش (وزوز گوش)
- بالا رفتن ضربان قلب
- احساس ضعف
- اسپهال
- التهاب فضای داخل دهان و لب ها
- درد شکم
- بثورات پوستی خارش دار و برجسته
- تورم لایه های عمیق تر پوست ناشی از تجمع مایعات
- خارش پوست
- تب
- افت فشار خون وضعیتی

عوارض نادر (کمتر از یک نفر در ۱۰۰۰ نفر):

- تنگی راه های هوایی
- تنگی نفس
- سوء هاضمه

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر، پیش از شروع درمان با استیل سیستئین با پزشک خود مشورت نمایید:

- داروهای ضدسرفه
- ذغال فعال
- آنتی بیوتیک ها
- نیترو گلیسرین

نحوه نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد، دور از نور، رطوبت، گرما و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه خودداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

این دارو باید حتما با تجویز پزشک مصرف شود. از در اختیار قراردادن دارو برای آشنایان حتی در صورتی که علائم مشابه شما را دارند خودداری کنید؛ زیرا ممکن است برای ایشان آسیب زا باشد.

شرکت دارویی اکتوورکو، کرج، ایران

